

حاملگی نابجا چیست ؟

لانه گزینی بلاستوسیست (تخمک لقاح یافته) را در هر مکانی غیر از حفره رحم، حاملگی نابجا می گویند. حاملگی نابجا در زنان نازا، گروههای با سطح اقتصادی-اجتماعی پایین، زنان غیر سفید پوست و در زنانی که یک حاملگی نابجای قبلی داشتند، بیشتر دیده می شود.

محل های حاملگی نابجا به ترتیب:

*لوله رحمی

*تخمدان

*شکم

*دهانه رحم

شایعترین محل های جایگزینی حاملگی خارج رحم ، لوله های رحمی است.

عوامل موثر در حاملگی نابجا


دلایل احتمالی آن ممکن است عفونت های لوله های رحمی ، چسبندگی اطراف لوله ، غیرطبیعی بودن ساختمان آناتومیکی لوله ها، سابقه داشتن حاملگی خارج رحمی در حاملگی های قبلی، سابقه عمل جراحی لوله ای ، سابقه چند سقط عمدی(به ویژه اگر همراه با عفونت باشد) ، تومورهای لوله که موجب تغییر شکل لوله میشوند، وجود آی یو دی و استفاده از قرصهای پروژستین به تنهایی برای پیشگیری از بارداری باشند.

وجود عفونت های لگنی به نظر میرسد شایعترین عامل موثر در حاملگی خارج رحمی باشد.


علائم بالینی :

بستگی دارد به اینکه آیا پارگی لوله اتفاق افتاده باشد یا خیر.

به هر حال تاخیر در سیکل قاعدگی بمدت ۱-۲ هفته و بدنبال آن خونریزی کم واژینال (لکه بینی) ، خونریزی کم غیرطبیعی، نشاندهنده احتمال وقوع حاملگی خارج رحمی است.



تصویر حاملگی خارج از رحم در لوله رحمی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان زنجان

مرکز آموزشی درمانی الغدير ابهر

واحد آموزش بیمار

حاملگی خارج از رحم



چنانچه حاملگی خارج از رحمی مشکوک باشد ، بیمار توسط سونوگرافی مورد ارزیابی قرار می گیرد و آزمایشات تشخیصی انجام می شود.

به دلیل اینکه احتمال حاملگی خارج از رحم برای باردیگر نیز وجود دارد ، به بیمار توصیه میشود تا قبل از برنامه ریزی برای حاملگی بعدی مورد بررسی و مشاوره قرار گیرد و از همان اوایل حاملگی زیر نظر باشد .

منبع : برونر سوارث ۲۰۱۸

با تایید دکتر سیده سپیده نقیبی

متخصص زنان و زایمان

علائم ممکن است با تاخیر بروز کنند ، شامل احساس درد مبهم در طرف مبتلا به دلیل اتساع لوله ها و انقباض رحمی ، که ممکن است به دردهای شدید کولیکی تبدیل شود. علائم گوارشی ، سرگیجه و سردرد ممکن است وجود داشته باشند.

چنانچه حاملگی خارج رحمی تشخیص داده نشود و مدت ۶-۴ هفته یا بیشتر از لقاح گذشته باشد ، احتمال وقوع پارگی لوله زیاد است.

پارگی با احساس درد شدید ، تهوع ، استفراغ و شوک همراه است

برای پیشگیری از خونریزی کشنده که عارضه عمده پارگی لوله ها می باشد . حاملگی خارج از رحم باید سریعاً تشخیص داده شود.

درمان :

بصورت دارویی و جراحی است.