

آنژیوپلاستی کرونری داخل مجرای از طریق

پوست :

یک روش مداخله ای تهاجمی است که در بیماران مبتلا به آنژین صدری و نیز در سکنه قلبی حاد استفاده می شود. در مواردی که یک سرخرگ کرونر (سرخرگ قلبی) درگیر باشد و کمتر از یک سال از شروع ضایعه گذشته باشد استفاده می شود.

روش انجام آنژیوپلاستی:

در این روش قبل از انجام آن محل ضایعات و نقاط تنگ در شریان کرونری با آنژیوگرافی باید با دقت مشخص شود. سپس کاتتری که در نوک آن یک بالون وجود دارد از راه شریان فمورال (در کشاله ران) یا شریان دست وارد آنورت شده و سپس وارد یکی از شریانهای کرونر مسدود می شود و سپس بالون به منظور فشار آوردن بر روی لخته و خرد کردن آن و باز کردن شریان باد می شود.

مراقبت ها قبل از آنژیو پلاستی:

بیشتر بیماران در روز انجام آنژیو پلاستی در بیمارستان بستری می شوند.

گرفتن رضایت شخصی جهت آنژیوپلاستی لازم می باشد. (خطرات احتمالی در حین آنژیوپلاستی و بعد از آن برای بیمار شرح داده میشود تا در صورت بروز خطر بیمار انتظار آن را داشته باشد).

حدود 8 ساعت قبل از آنژیوپلاستی هیچ نوشیدنی و خوراکی نباید مصرف شود.

علائم حیاتی بیمار توسط پرستار کنترل می شود. نوار قلب از بیمار تهیه میشود.

هر نوع حساسیت غذایی یا دارویی باید به اطلاع پرستار و پزشک معالج رسانده شود.

موهای محل ورود کاتتر باید تمیز شود.

دندانهای مصنوعی و اشیا فلزی همراه بیمار نباشد.

مراقبتهای بعد از انجام آنژیوپلاستی:

بعد از انجام آنژیو پلاستی ابتدا 20 دقیقه فشار روی محل و سپس پانسمان فشاری روی محل ورود کاتتر انجام می شود و بیمار باید صاف به پشت روی تخت بخوابد. برای کاهش خونریزی سر و گردن بالانباشد. برای جلوگیری از خونریزی پوایدست مربوطه را راست نگه دارد.

4-6 ساعت کیسه شن یا کمر بند مخصوص روی


محل پانسمان می گذارند.


قع عطسه و سرفه فشار روی محل پانسمان انجام شود. (برای جلوگیری از خونریزی محل).

برای راحتی بیمار مسکن یا آرام بخش استفاده شود. علائم حیاتی بیمار کنترل میشود و نوار قلب از بیمار گرفته می شود.

محل ورود کاتتر از نظر خونریزی باید کنترل شود. برای برطرف شدن سریع تر ماده حاجب (که حین آنژیوپلاستی و آنژیوگرافی به بیمار تزریق شده بود) بیمار مایعات فراوان بنوشد.

معمولا روز بعد از آنژیوپلاستی بیمار از بخش مرخص می باشد.





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان زنجان


مرکز آموزشی درمانی الغدير ابهر

واحد آموزش بیمار

آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب



شماره تلفن بیمارستان الغدير جهت پاسخگویی به
سوالات بیماران 02435368200 بخش



منبع: مراقبتهای ویژه پرستاری تألیف محمد رضا
عسگری

با تأیید: دکتر محمدرضا عیدی (متخصص قلب
وعروق)

تهیه کننده: مریم اله یاری (کارشناس پرستاری)

تدوین: واحد آموزش به بیمار بیمارستان الغدير ابهر

مراقبت از محل آنژیوگرافی در منزل:

روز بعد از آنژیو پلاستی پانسمان با یک باند چسبناک
عوض می شود.
به بیمار در مورد علائم خونریزی و یا ایجاد یک توده
سفت که نشانه هماتوم می باشد آموزش داده میشود.
بلند کردن اشیا سنگین و کار سنگین ممنوع میباشد.
بالا رفتن از پله و رانندگی تا یک هفته ممنوع می
باشد.

معمولاً پانسمان روی محل آنژیو پلاستی روز بعد در
حمام برداشته می شود.

علائم خطر بعد آنژیوپلاستی:

احساس گرمی و داغی یا خیس شدن ناحیه
تورم و درد شدید محل آنژیوپلاستی
درد قفسه سینه
خونریزی ناگهانی
تغییر در گفتار یا بینایی

در صورت بروز هر کدام از عوارض فوق
سریعا به پزشک معالج خود اطلاع دهید.