

به هیچ وجه دستکش جایگزین شستشوی دست با آب و صابون یا ضد عفونی با محلولهای Hand rub نمی شود.

استفاده نا مناسب از دستکش عامل انتقال پاتوژن ها می باشد.

ضرورت استفاده از دستکش و انتخاب نوع مناسب آن (دستکش تمیز یا استریل) در موقعیت های مختلف ارائه خدمات منطبق با موازین احتیاطات استاندارد و روش انتقال می باشد. اگر به صورت منطقی تماس با خون یا سایر مواد بالقوه عفونی، غشاء مخاطی یا پوست آسیب دیده پیش بینی می شود، پوشیدن دستکش ضروری است. لذا الزامی است هر بیمارستان دارای خط مشی شفاف در ارتباط با موارد استفاده از دستکش متناسب با موقعیت های مختلف ارائه خدمات به بیماران باشد.

از یک جفت دستکش فقط برای ارائه خدمات یا مراقبت از یک بیمار استفاده کنید.

در صورتی که در حین مراقبت از یک بیمار و بعد از اتمام یک اقدام درمانی در یک ناحیه آلوده نیاز است یا موضع دیگر همان بیمار (مشتعل بر پوست

آسیب دیده، مخاطات یا ابزار پزشکی) یا محیط لمس شود، دستکش را در آورده یا عوض کنید.

شدیدا توصیه می شود که از استفاده مجدد دستکش ها اجتناب نمایید. در صورت ضرورت، با به کار گیری استانداردهای روشهای بازیابی از سلامت و میکروب زدایی دستکش ها اطمینان کسب نمایید.



shutterstock.com • 1471678784


در مواردی لازم است از دستکش استریل استفاده شود که شامل:

1. انجام هر گونه اقدامات جراحی
2. زایمان و ژینال
3. اقدامات رادیولوژیکی تهاجمی
4. برقراری راه عروقی و انجام اقدامات مرتبط به راههای عروقی (ایجاد راه وریدی مرکزی در بیماران)
5. آماده نمودن محلولهای تغذیه مکمل جهت انفوزیون



و در برخی موارد نیاز به دستکش استریل نیست و پوشیدن دستکش تمیز لازم است که شامل:

1. تماس مستقیم با بیمار شامل:
- 1-1: احتمال قرار گرفتن در معرض خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی بیمار و اشیاء و مواردی که به صورت مشهود آلوده به مایعات دفعی و ترشحات بیمار می باشد.
- 2-1: تماس با غشاء مخاطی و پوست آسیب دیده بیمار
- 3-1: احتمال قرار گرفتن در معرض تماس ارگانیسم های شدیدا عفونی و خطرناک
- 4-1: موقعیت های اورژانس یا اپیدمی
- 5-1: گذاردن یا کشیدن آنژیوکت و...
- 6-1: گرفتن خون از بیمار
- 7-1: قطع یا بستن راه ورید
- 8-1: کشیدن خون
- 9-1: معاینات لگنی و وژینال در بیماران
- 10-1: ساکشن داخل نایی (ایندو تراکیال)
2. تماس غیر مستقیم با بیمار
- 1-2: تخلیه مواد برگشتی از معده بیمار



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان زنجان

مرکز آموزشی درمانی الغدير ابهر

واحد آموزش بیمار

انديکاسيون استفاده از دستکش



تماس غیر مستقیم با بیمار:

1: استفاده از گوشی تلفن مشترک بین بیماران و کادر

2: درج گزارش در پرونده بالینی و یا چارت بالای سر بیمار

3: دادن داروی خوراکی به بیماران

4: جمع آوری سینی غذا و یا قطع لوله تغذیه ای بیمار

5: تعویض ملحفه بیمار (در صورتی که بیمار ایزوله

تماسی نباشد و یا ملحفه بیمار آلوده به ترشحات و مواد دفعی نباشد.

6: گذاردن ماسک تنفسی و یا کاتولای بینی به صورت

غیر تهاجمی برای بیمار

7: جا به جایی اثاثیه بیمار

منبع: دستورالعمل وزارت بهداشت در زمینه رعایت بهداشت دست

باتایید سوپروایزر کنترل عفونت سحر دهقانی

تهیه و تنظیم: مریم اله یاری (کارشناس پرستاری)

تدوین: واحد آموزش به بیمار بیمارستان الغدير

2-2: جابه جایی یا تمیز کردن وسایل و تجهیزات

3-2: جابه جایی یا تخلیه پسماند

4-2: تمیز نمودن ترشحات مایعات بدن پاشیده شده

روی اشیاء و یا در ضمن لکه گیری البسه

مواردی که پوشیدن دستکش ضروری نمی باشد:

در مواردی که احتمال تماس مستقیم یا غیر

مستقیم کارکنان بهداشتی درمانی با خون

، مایعات بدن بیمار و یا محیط آلوده وجود ندارد شامل:

تماس مستقیم با بیمار:

1: گرفتن فشار خون، درجه حرارت و نبض بیمار

2: تزریق زیر پوستی یا عضلانی به بیمار

3: لباس پوشانیدن به بیمار

4: انتقال بیمار

5: مراقبت از گوش و یا چشم بیماران در صورت

فقدان ترشحات

6: هر گونه مراقبت از راه وریدی در بیماران در

صورت عدم نشئت خون