

در صورتی که شما در دستگاه گوارش فوقانی خود مشکلاتی مانند : درد در ناحیه معده ، شکم ، سختی در بلعیدن غذا ، استفراغ ، خونریزی ، زخم یا توده دارید ، آندوسکوپی روشی برای مشاهده اجزاء داخلی بدن می باشد و در تشخیص یا درمان بیماری شما کمک کننده است.

آندوسکوپ چیست؟

آندوسکوپ یک لوله ی طویل و نازک بوده که قابلیت انعطاف داشته و تصاویر را دریافت میکند. جزئیات تصاویر از طریق یک نمایشگر به پزشک در تشخیص مشکل شما کمک می کند. از طریق آندوسکوپ برداشتن پولیپ و اقدامات دیگر نیز امکان پذیر است ؛ اگر منبع یک زخم هم پیدا شود به توسط آندوسکوپ سوزانده می شود تا خونریزی متوقف گردد ؛ اگر پزشک بافت مشکوکی را مشاهده نماید از آن نمونه برداری می کند که به این عمل بیوپسی میگویند .

برداشتن بیوپسی روشی سودمند است که در تشخیص رشد غیر عادی سلول ها به کار میرود ؛ همچنین آندوسکوپی باکتری هایی را که زخم های گوارشی را ایجاد میکند را معین مینماید. آندوسکوپی برای تست RVT نیز استفاده می شود.

آیا بعد از آندوسکوپی نیاز به بستری شدن داریم ؟

آندوسکوپی معمولاً یک روش سرپایی محسوب می گردد بدین معنی که شما بعد از انجام آن میتوانید به منزل خود مراجعه نمایید این عمل ممکن است در مطب پزشک یا بیمارستان انجام شود .

قبل از آندوسکوپی :

قبل از هرچیز با پزشکتان در مورد مشکل و بیماری خاصی که دارید یا دارویی که مصرف میکنید ، صحبت کنید. زیرا مشکلات مربوط به ریه ها و قلب ممکن است قبل یا در طول آندوسکوپی یا بعد از آن، به درمان خاصی نیاز داشته باشد. بعضی از افراد، قبل از این مراحل نیازمند آنتی بیوتیک میباشند.




اگر شما دارویی مصرف میکنید میبایست از پزشکتان سوال نمایید که آنرا قبل از آندوسکوپی میتوانید مصرف کنید یا نه ؟

در انجام برخی پروسیجر با مشورت پزشک قبل از انجام آندوسکوپی آسپرین و ایبوپروفن و داروهای شبیه به آن را 7 روز قبل از آندوسکوپی مصرف نکنید ، زیرا که این محصولات خطر خونریزی را افزایش میدهند.

پس از اتمام آندوسکوپی پزشک معالج به شما خواهد گفت که چه زمانی از داروهایتان میتوانید دوباره استفاده نمایید .
*8 ساعت قبل از آندوسکوپی نباید چیزی بخورید یا نوشیدنی بیاشامید.
*از نیمه شب قبل از آندوسکوپی نباید سیگار بکشید.

*چرا باید در طی آندوسکوپی معده ما خالی باشد؟
وجود غذا در دستگاه گوارش فوقانی از مشاهده قسمت مورد نظر جلوگیری مینماید و به علاوه باعث استفراغ و بروز مشکلات پیچیده ای میشود.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان زنجان

مرکز آموزشی درمانی الغدير ابهر

آندوسکوپي

واحد آموزش بیمار



شماره تلفن بیمارستان الغدير جهت پاسخگویی به
سوالات بیماران 02435368200 بخش

بعد از آندوسکوپي :

* تا برگشت بی حسی چیزی نخورید.
* هنگامی که آماده می شوید تا به خانه بروید
رانندگی ننمایید.
در صورت مشاهده علائم زیر پزشک خود
را باخبر کنید:
بلع دردناک - گلود متورم - درد قفسه سینه
تب و مدفوع سیاه یا بسیار تیره.



منبع : درسنامه پرستاری

تهیه کننده : هانیه بهزادپور کارشناس

پرستاری

با تایید دکتر ابراهیم مرتضوی متخصص

داخلی

تدوین : واحد آموزش به بیمار

حین آندوسکوپي :

قبل از شروع کار به شما یک داروی آرامبخش داده
میشود تا آرام باشید.
معمولاً بیشتر بیماران در طی انجام کار میخوابند .
از شما درخواست خواهد شد که پیراهن خود را خارج
نمایید و از یک روپوش مخصوص استفاده کنید.
همچنین اگر از دندان مصنوعی استفاده مینمایید
میبایست آنها را خارج سازید.
شما باید به پهلوی چپ دراز بکشید.
پزشک به صورت موضعی ، حلق شما را بی حس
می کند ، این کار بایک اسپری یا ژل یا یک دارو
انجام می شود .
شما در طول این جریان نباید احساس درد نمایید و باید
خودتان قادر باشید که نفس بکشید.
وقتی آندوسکوپ در بدن شما قرار گرفت شما احساس
فشار میکنید، بدلیل اینکه آندوسکوپ مقداری هوا به
درون معده شما وارد می نماید تا پزشک بهتر بتواند
داخل معده شما را مشاهده کند.
مری، معده با دقت در طول آندوسکوپي مشاهده می
شوند.
پزشک شما ، نواحی را که به ارزیابی و تشخیص و
درمان نیاز دارد ، با دقت مشاهده میکند، در این حالت
پزشک ، التهاب ، خونریزی یا رشد غیر عادی را
میتواند مشاهده کند .